

Transition : adapter les animaux à de nouvelles conditions

La mise à l'herbe, la rentrée d'automne et d'autres périodes de pâturage réclament une adaptation des animaux aux changements de milieu ou d'alimentation



POURQUOI ?

Le pâturage constitue rarement le seul mode d'alimentation des herbivores domestiques. Lorsque l'herbe pâturée redevient un constituant important du régime, que l'animal doit prélever par lui-même dans un environnement où il est moins protégé qu'en bâtiment, le respect d'une période de transition doit permettre aux animaux de mieux s'adapter (ingestion, métabolisme et comportement) à ces nouvelles conditions en toutes saisons. Sans risquer un incident de santé plus ou moins grave (météorisation, entéro-toxémie).

PAS SI SIMPLE D'Y ALLER

▲ **Mettre à l'herbe dans les meilleures conditions possibles : pas toujours facile !** Des parcelles portantes et des conditions printanières tous les ans à la mise à l'herbe, ça ne se commande pas. Pour éviter des conditions trop délicates, il faut parfois prolonger longtemps l'offre de fourrages conservés.

▲ **Certains changements de régime ne disent pas leur nom...** Elargir le pâturage sur des repousses riches en trèfle peut être aussi perturbant qu'une mise à l'herbe. Le rationnement est une précaution pour limiter les comportements boulimiques, ainsi que la distribution de foin avant l'accès à la parcelle quand les risques sont trop importants.

DIVERSIFIER L'ALIMENTATION

▲ **Il n'est pas question d'obliger brutalement les animaux à ne consommer que de l'herbe pâturée !** Il faut associer, pendant au minimum 2 à 3 semaines, une ration diversifiée associant fourrage conservé et fourrage pâturé. Il faut pouvoir disposer d'un temps d'accès en bâtiment (nuit par exemple ou quelques heures après la traite) avec un fourrage à l'auge ou en râtelier. Ou mettre à disposition du foin ou de l'enrubannage dans un râtelier de pré.

Convaincre les animaux de diversifier leur alimentation...



DES CONSEILS POUR RÉUSSIR

- ▲ Une ambiance favorable et des prairies portantes.
- ▲ Au printemps, sortir tôt pour limiter les quantités d'herbe ingérées : donc continuer d'offrir des fourrages conservés.
- ▲ A l'automne (voire en été) mettre du fourrage conservé à disposition de manière progressive.
- ▲ Moduler la durée de sortie selon les conditions (météo, portance).
- ▲ Le maintien de nuit en bâtiment est un moyen pour moduler les conditions de la transition.
- ▲ Engager la transition sur les parcelles destinées à être pâturées plutôt que fauchées.
- ▲ Accepter les fortes variations journalières de consommation du fourrage conservé.
- ▲ Moins de 15 jours de transition alimentaire doit rester exceptionnel.
- ▲ En cas de transition avec des prairies riches en légumineuses, il est prudent de distribuer du foin, afin de limiter le risque de météorisation.
- ▲ Une transition réussie réclame de l'anticipation.



IMPACTS POUR LA DURABILITÉ

- Ménager de bonnes transitions alimentaires préserve les animaux de troubles de performances qui peuvent être très sévères et pénaliser les productions animales.
- Prendre soin de ses prairies et de ses animaux doit être la première préoccupation d'un éleveur d'herbivores soucieux de son environnement.
- Des herbivores productifs et en bonne santé au pâturage donnent une image résolument positive de l'élevage à la société civile.

POUR EN SAVOIR PLUS

- **Bien conduire le pâturage pour optimiser la valorisation de l'herbe** - CA Bourgogne Franche Comté, 2017.
- **Guide pratique de l'éleveur : produire avec de l'herbe, du sol à l'animal** - CA Bretagne et Pays de Loire, 2011.
- **La mise à l'herbe ; une transition à bien maîtriser** - CA 40.
- **Pour une bonne mise à l'herbe** - Idele. 2016-<http://idele.fr/rss/publication/idelesolr/recommends/la-mise-a-lherbe-approche.html>.

Témoignages

« On attend cette mise à l'herbe depuis si longtemps !!! Des conditions aussi idéales, c'est inespéré... et rassurant à la fois : l'ambiance est quasi estivale, la portance revenue et en prime, il y a même de l'herbe à pâturer ! ne reste plus qu'à les convaincre de continuer à manger encore un peu de foin... » - Rémi L., éleveur bovin lait (88)

VERS D'AUTRES FICHES

- Fiche 8 – Tirer parti de la diversité
- Fiche 16 – Les modes de pâturage
- Fiche 19 – Les jours d'avance
- Fiche 22 – Le déprimage
- Fiche 76 – La tétanie d'herbage

Retrouvez la fiche enrichie et l'ensemble du guide pâturage sur www.encyclopediapratensis.eu

