# Pour éviter de retourner sa pâture !

*Les prairies pâturées dégradées peuvent être améliorées pour accroître leur productivité et leur souplesse d'exploitation. Le retournement n'est pas la solution…*

## POURQUOI ?

**Retourner ma prairie, c'est du travail, de l'argent et une perte provisoire de production : autant l'éviter ! Comprendre pourquoi ma prairie se dégrade en observant la végétation et en listant les évènements survenus sur la parcelle me permettra d'en déduire les pratiques qui ont fait évoluer la flore. Si je refais ma prairie et que je ne change rien à mes pratiques, je retomberai dans le même problème. Que faire pour éviter de labourer !**

## MODIFIER SES PRATIQUES

▲ Adapter le chargement au contexte climatique, faucher les refus, adapter la fertilisation azotée pour densifier la prairie et augmenter naturellement la proportion de légumineuses.
▲ Limiter le pâturage aux périodes de faible portance, le surpâturage, les broyages à très faibles hauteurs d'herbe (‹ à 5 cm.), les hersages trop agressifs.
▲ Adapter la fertilisation (P, K et chaulage éventuel) à la fréquence de pâturage pour permettre une évolution naturelle de la flore vers des espèces présentant une meilleure appétence (ray-grass anglais, trèfle blanc) ou vers une diversité d'espèces permettant plus de souplesse d'exploitation (pâturin des prés, légumineuses..., ).

## SURSEMER

▲ **Le sursemis est une solution à envisager** si la prairie est fortement dégradée suite à des dégâts de ravageurs, un matraquage par du piétinement ou du matériel agricole, un désherbage chimique sélectif qui aurait conduit à la présence importante de trous dans la végétation...
▲ **Le sursemis suppose un certain nombre de précautions :**
- Réduire au préalable la végétation à un couvert ras par un pâturage ou une fauche sévère,
- Affiner l'horizon de semis (terre fine – griffage à la herse),
- Choisir des espèces prairiales agressives,
- Semer dense, à la même densité qu'en sol nu,
- Proscrire la présence d'espèces allélopathiques qui empêchent la levée (agrostide stolonifère, houlque molle, chiendent, ortie...).

Le coût de remise en état d'une prairie, selon le mode de semis (barème entraide CUMA2015)

| | Resemis | | Sursemis | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | Semis travail simplifié | | Semoir direct | | Semoir céréales | |
| | Temps (h/ha) | Coût (€/ha) | Temps (h/ha) | Coût (€/ha) | Temps (h/ha) | Coût (€/ha) |
| Cover crop (6 m) en ressemis ou herse étrille en suremis | 0h50 | 12 € | 0h20 | 6 € | 0h20 | 6 € |
| Semoir combiné (A) ou direct (B) ou classique (C) | 0h40 | 30 € | 0h35 | 30 € | 1h15 | 9 € |
| Rouleau packer (6 m) | 0h20 | 8 € | 0h20 | 8 € | 0h20 | 8 € |
| Tracteur 110 CV-4 RM (20 €/h, carburant compris) | 1h50 | 37 € | 0h55 | 18 € | 1h55 | 38 € |
| Main-d'oeuvre (18 €/h) | 1h50 | 33 € | 0h55 | 17 € | 1h55 | 38 € |
| TEMPS (h/ha) et COÛT TOTAL (€/ha) | 1h50 | 120 € | 0h55 | 79 € | 1h55 | 95 € |

## DES CONSEILS POUR RÉUSSIR

**▲ Modifier les pratiques**

- Réduire le chargement.
- Faucher les refus.
- Favoriser les légumineuses.
- Proscrire le surpâturage.

**▲ Réussir son sursemis**

- Semer à la fin de l'été (15 aout - 15 septembre). Sans risque de stress hydrique estival, semis possible au printemps, après une première coupe (à 350-400° jours).
- Réaliser un semis superficiel sur sol rappuyé.
- Limiter la fertilisation azotée : pas plus de 40 N en semis de printemps et rien en semis d'automne.
- Réaliser une première coupe en fauche précoce, pour favoriser le jeune semis.

**▲ Exemple d'itinéraire technique en ressemis**

- travailler la couche superficielle du sol (rotavator, herses, covercrop).
- Roulez avant le semis, si le sol est très meuble.
- Semer au semoir en ligne à 1-2cm de profondeur et à 25-30 kg/ha.

## IMPACTS POUR LA DURABILITÉ

■ Éviter de retourner sa prairie limite le temps pendant lequel la parcelle sera improductive.
■ Ne pas labourer sa prairie, c'est maintenir son stock de carbone.
■ C'est aussi limiter les risques de fuite de nitrate.
■ Et c'est moins de travail et de consommation de carburant !

## POUR EN SAVOIR PLUS

■ **Réussir ses prairies : du choix des mélanges à l'implantation** - Herbe Limousin, 2016.
■ **Entretenir ses prairies pour qu'elles durent** - Réseau Agriculture Durable, 2011.
■ **Réussir ses semis de prairies** - Réseau Agriculture Durable, 2011.
■ **Réussir l'implantation de la prairie** - CA Landes, 2014.
■ **La rénovation des prairies** - . Livret Fourrages Mieux Wallonie, 2015.

| Adventices en prairies naturelles (%) | Sans fauche des refus | Avec fauche des refus |
|---|---|---|
| Eté | 55% | 40% |
| Autome | 58% | 38% |

La fauche des refus limite le développement des adventices (réseau - Puy de Dôme)

En cas de dégradation excessive, le sursemis peut s'avérer nécessaire

### Témoignages

« Fin août, on a fait un sursemis. Durant l'automne et en fin d'hiver, on avait l'impression que cela n'avait pas réussi, mais à partir de l'été suivant, les parcelles sursemées se sont réellement démarquées avec une capacité de repousse accrue. On voyait nettement les lignes de semis. Il faut laisser du temps pour que l'implantation se réalise correctement » - Gaec de la Rochette (63).

## VERS D'AUTRES FICHES


Fiche 3 – Diagnostiquer l'état de vos prairies
Fiche 21 – Les refus au pâturage
Fiche 26 – La rénovation des prairies
Fiche 30 – Associer pâture et fauche
Fiche 36 – Séquestrer du carbone
Fiche 64 – Le semis de la prairie


Retrouvez la fiche enrichie et l'ensemble du guide pâturage sur www.encyclopediapratensis.eu


Guide pâturage : 100 fiches pour répondre à vos questions - Référence : 0018303007– ISBN : 978-2-36343-938-3 Mars 2018
Fiche 31 - Pour éviter de retourner sa pâture
Auteur principal : Jean Zapata (EDE 63)
Création : Marie Catherine Leclerc (Institut de l'élevage) - Mise en forme : Magali Allié (Institut de l'élevage)
Photos : J Zapata (EDE 63), S Novak (Inra)



CC BY NC ND